

## Het is geen worm en ook geen slang

Het is begin mei en het is nog warm in het begin van de avond. Ondanks dat een uur geleden een stevige bui het hele bos schoon waste. Bij ieder zuchtje wind hoor je nog steeds druppels tikken op de dikke laag bladeren op de bodem. Het natte asfalt van de Prins Hendriklaan glinstert in het licht van de ondergaande zon. Enkele zwarte naaktslakken glijden over het wegdek. Ook enkele regenwormen wagen de oversteek. Even ben ik van de wijs. Wow dat is wel een héle grote worm. Midden op de weg probeert een hazelworm ook de overkant te bereiken.



Het dier maakt kronkelende bewegingen waarmee hij zichzelf vooruit probeert te duwen, maar hij glijdt steeds weg. Het wegdek is glad en hij komt maar langzaam vooruit. Hoewel hij met z'n ongeveer 35 centimeter veel groter is dan de slakken komt hij op het natte asfalt maar nauwelijks sneller vooruit. Een hazelworm is geen worm en ondanks het slangachtige voorkomen is het ook geen slang.

Het is een hagedis die in de loop van evolutie zijn poten is kwijtgeraakt. De bewegingen van de hazelworm zijn veel stijver dan die van slangen. Een fietspad of weg oversteken kost daardoor veel tijd. Dat maakt de kans om overreden te worden groot.

Hazelwormen blijven het liefst onder de begroeiing, in de dikke laag bladeren, onder dood hout of in holletjes in de bodem. Om je in die nauwe ruimtes te bewegen zijn zijn poten helemaal niet handig. Ze eten het liefst naaktslakken en regenwormen. Om die te vangen hoef je ook niet echt te kunnen rennen. De tanden van de hazelworm staan een beetje schuin naar achter in de bek. Handig als je zo'n glibberige prooi moet vasthouden.

Net als alle hagedissen is de hazelworm een reptiel dus hij moet zijn lichaamstemperatuur op peil zien te houden. Soms zonnen ze verborgen in het gras langs de bosrand, maar nog liever maken ze gebruik van broeiwarmte onder dood hout of in een hoop maaisel. Ook van wat rommel zoals een oude plank of dakpan maken ze dankbaar gebruik. Hieronder ben je niet zichtbaar voor kraaien, gaaien, valken, fazanten, egels, wezels, bunzings en al die andere belagers. Dat is veel veiliger. Bij gevaar kunnen ze net als andere hagedissen hun staart laten afbreken. De aanvaller denkt dan dat hij de hazelworm te pakken heeft, maar blijft beteuterd achter met een stukje staart. De staart groeit binnen enkele weken weer aan.

In De Utrecht leven ze in het beekdal van de Reusel. Ook in de omgeving van de herberg In den Bockenreyder, kunnen ze door wandelaars gezien worden.

Ziet u een hazelworm noteer dan de plek zo nauwkeurig mogelijk. Noteer ook de datum en de naam van de vinder en maak als het kan een fotootje. Voer de waarneming in in [www.Telmee.nl](http://www.Telmee.nl) of [www.waarneming.nl](http://www.waarneming.nl) of als dat niet lukt, mail deze gegevens dan naar [a.rijsewijk@ravon.nl](mailto:a.rijsewijk@ravon.nl)

Met deze gegevens kan bij het beheer beter rekening gehouden worden met dit bijzondere dier en levert u dus een bijdrage aan de bescherming van de natuur. Mooi toch!